

# Sécrétagogues de l'insuline, sulfonylurées

<b>Classe de médicaments</b>	Sécrétagogues de l'insuline, sulfonylurées
<b>Mécanisme d'action</b>	Stimulent la sécrétion d'insuline par le pancréas.
<b>Noms habituels</b>	Glicazide (Diamicon®), glimépiride (Amaryl®), glyburide (DiaBeta®).
<b>Doses usuelles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glicazide : 80 - 320 mg en dose unique ou fractionnée</li> <li>• Gliclazide MR : 30 - 120 mg une fois par jour</li> <li>• Glimépiride : 1 à 8 mg une fois par jour</li> <li>• Glyburide : 2,5 à 20 mg en dose unique ou fractionnée</li> </ul>
<b>Posologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le glyburide et le gliclazide doivent être pris à la même heure chaque jour, soit avant ou pendant les repas.</li> <li>• Le gliclazide MR et le glimépiride doivent être pris au déjeuner ou lors du premier repas de la journée.</li> </ul>
<b>Que dois-je faire lorsque j'oublie une dose ?</b>	Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé.
<b>Baisse du taux d'A1C</b> (↓ = moins, ↓↓↓ = plus)	↓↓↓
<b>Effet sur le poids</b>	↑
<b>Risque d'hypoglycémie</b>	Oui
<b>Considérations thérapeutiques et/ou effets indésirables</b>	Peuvent provoquer une hypoglycémie (surtout lorsque les repas ou les médicaments ne sont pas pris à heures régulières).
<b>Quand devez-vous appeler votre médecin ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre équipe de soins de santé si vous avez de nombreuses réactions hypoglycémiques ou si vous avez de la difficulté à traiter l'hypoglycémie.</li> <li>• Communiquez avec votre équipe de soins de santé lorsque vous ressentez de graves effets indésirables ou que vous observez une détérioration quelconque de votre état de santé global.</li> </ul>
<b>Que devez-vous faire quand vous êtes malade ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous devez cesser ces médicaments lorsque vous êtes malade, que vous vomissez, que vous avez la diarrhée ou que vous ne pouvez pas prendre suffisamment de liquides. Attendez que les symptômes disparaissent avant de recommencer à les prendre.</li> <li>• Vérifiez plus souvent votre glycémie et buvez beaucoup de liquides pour prévenir une déshydratation.</li> </ul>
<b>Coût</b> (\$ = plus bas, \$\$\$\$ = plus élevé)	\$